

医薬品情報

2012.7.20 No. 341
独立行政法人国立病院機構 盛岡病院 薬剤科

外科的手術を行う際に休薬期間が必要な当院採用医薬品について

標記について別紙のとおり改訂しましたので、お知らせ致します。
なお、不明な点につきましては薬剤科までお問い合わせ下さい。

外科的手術を行う際に休薬期間が必要な当院採用医薬品

分類	一般名	製品名	主な作用機序	休薬期間	文献
抗凝固薬	ワルファリンカリウム	ワーファリン錠	循環血液中の血液凝固因子に直接作用せず、肝臓でビタミンK依存性凝固因子の第2・第7・第9・第10因子の合成を阻害することにより抗凝固作用・抗血栓作用を示す	3~4日	添付文書
	ダビガトランエテキシラー トメタンシルボン酸塩	プラザキサカプセル	トロンビンの活性部位に直接かつ選択的に結合して活性を阻害	2日	添付文書
血小板凝集抑制薬	アスピリン	バイアスピリン錠 パファリン81mg錠 (院外用) アスピリン(院外用)	血小板のシクロオキシゲナーゼの阻害	7~10日	添付文書
	塩酸チクロピジン	チクピロン錠・細粒 パナルジン錠・細粒	血小板のアデニレートシクラーゼ活性増強、血小板のGP IIb/IIIa受容体へのフィブリノーゲンの結合阻害	10~14日	添付文書
	シロスタゾール	フレニード錠 プレタール錠	血小板のホスホジエステラーゼ活性阻害	2~4日	メーカー
	塩酸サルボグラート	アンブラーグ錠	血小板の5-HT ₂ レセプター阻害	1~2日	メーカー
	イコサペントエン酸エチル	イコサペント酸エチル粒状カプセル エパデールS	血小板リン脂質中のEPA含量を増加させ、血小板膜からのアラキドン酸代謝を競合的に阻害する	7~10日	薬事 Vol.45No.3
	ベラプロストナトリウム	プロルナー錠	プロスタグランジン受容体への結合からアデニレートシクラーゼ活性化	1~2日	薬事 Vol.45No.3
	クロピドグレル硫酸塩	プラビックス錠	血小板のADP受容体に作用し、ADPの結合を阻害	14日	添付文書
冠拡張薬	トラビジル	ロコルナール錠	ホスホジエステラーゼ活性阻害、トロンボキサンA ₂ 合成阻害	2日	薬事 Vol.45No.3
	塩酸ジラセブ	コメリアンコーワ錠	血小板のホスホリパーゼ活性阻害	2日	薬事 Vol.45No.3
	ジピリダモール	ベルサンチン錠 アンギナール錠 ピロアン錠	血小板のホスホジエステラーゼ活性阻害	2日	薬事 Vol.45No.3
脳循環・代謝改善薬	イブジラスト	ケタスカプセル	血小板のホスホジエステラーゼ活性阻害	3日	薬事 Vol.45No.3
	酒石酸イフェンプロジル	セロクラール錠 アポノール錠	血小板のα ₂ -レセプターを介する作用	2日	薬事 Vol.45No.3
血管拡張薬	リマプロスト	オパルモン錠	プロスタグランジン受容体への結合からアデニレートシクラーゼ活性化 (凝固線溶系・出血時間に影響なし)	1~2日 (念のため)	メーカー
骨粗鬆症治療薬	ラロキシフェン塩酸塩	エビスタ錠	静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症、肺塞栓症、網膜静脈血栓症を含む)のリスクが上昇	3日	添付文書
三環系抗うつ薬	イミプラミン塩酸塩	トフラニール錠	麻酔薬の作用増強 (可能であれば中止した方が望ましい)	14日	日本手術医学会ガイドライン
	アミトリプチリン塩酸塩	トリプタノール錠			
	アモキサピン	アモキサカプセル (院外用)			
合成Xa阻害薬	エドキサパントシル酸塩水和物	リクシアナ錠	活性化血液凝固第X因子(FXa)を阻害 (術後の入院中に限り使用:手術後12時間を経過し、手術創等からの出血がないことを確認の上、原則14日間以内の使用)	1~2日 (目安)	メーカー

2012年7月改訂