

医薬品情報

2012. 7. 20

No. 343

独立行政法人国立病院機構 盛岡病院 薬剤科


シムビコートタービュヘイラーの用法用量の一部改訂について

標記について別紙のとおりシムビコートタービュヘイラーの用法用量が一部改訂され、追加吸入が可能となりましたのでお知らせ致します。

なお、不明な点につきましては薬剤科までお問い合わせ下さい。


シムビコート®タービューヘイラー®を使用される喘息患者さんへ

毎日の定期吸入は必ず行ってください。



★1日6吸入の場合は、朝3吸入・夜3吸入、1日8吸入の場合は、朝4吸入・夜4吸入です。

シムビコートによる「毎日の定期吸入」の役割



*咳、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)、息苦しさなどの症状



発作(症状)が出た時に**シムビコート®タービューエー®**を追加吸入するよう指示された喘息患者さんへ

以下のような**発作(症状)**が出た時には**速やかに追加吸入**しましょう。



- ぜんめい
・喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという音)が出る
- ・胸が苦しい
- ・咳き込んでしまう
- ・咳や息苦しさで目が覚める



まず**1吸入**してください。それでも発作(症状)が治まらない場合は、数分あけてもう1吸入してください。

朝・夜の定期吸入に加えて、
発作(症状)が出た時には**いつでも追加吸入**が可能です。

どちらかに ☒	定期吸入		+	追加吸入 発作(症状)が出た時	
	朝	夜			
☐ 定期吸入が 1日 2吸入の場合	1吸入	1吸入	+	1日合計 6吸入まで	1日通常 8吸入まで
☐ 定期吸入が 1日 4吸入の場合	2吸入	2吸入	+	1日合計 4吸入まで	

※1回の発作(症状)につき、**最大6吸入**まで可能です。

定期吸入に続いて追加吸入を行う場合は、定期吸入と合わせて**最大6吸入**までです。



※定期吸入と追加吸入を合わせて、**通常1日8吸入**まで可能です。

医師の指示がある場合、一時的に1日12吸入まで可能ですが、1日8吸入を超える場合や追加吸入の回数が増加した場合は喘息コントロールが十分でない可能性があるため、速やかに医師の診察を受けてください。


シムビコートによる「発作(症状)が出た時の追加吸入」の役割

発作(症状)が
出ている時の気道

- ・腫れ(炎症)がひどくなっています
- ・気道が狭くなり息が苦しくなります



発作(症状)が
起こりにくい気道



刺激に敏感な
腫れたままの気道

従来の発作治療薬の吸入では
気道は広がりますが、腫れは治まりません。

※服薬については、医師の指示通りに行ってください。

※喘息のコントロールのためには毎日の定期吸入が重要なので、毎日の定期吸入を必ず行ってください。

※発作(症状)が出た場合のシムビコートの追加吸入以外の治療薬については医師に相談してください。

お問い合わせ先

アストラゼネカ株式会社

受付時間 / 月～金 9:00～18:30 (土日・祝日除く)

メディカルインフォメーションセンター

☎ 0120-119-703

アステラス製薬株式会社

受付時間 / 月～金 9:00～17:30 (土日・祝日除く)

くすり相談センター

☎ 0120-865-093