

# 医薬品情報

2014. 11. 28 No. 405

独立行政法人国立病院機構 盛岡病院 薬剤科

## 1. 新規採用および採用中止医薬品について

平成26年11月に開催された薬剤委員会において、新規採用となりました医薬品について取りまとめましたので別紙のとおりお知らせいたします。

種別	申請医師	製品名	一般名	規格	包装単位	薬価	会社名	効能・効果	同種・同効薬	申請理由
1	限定 大山 素彦	トレリーフ錠25mg	ゾニザミド	25mg1錠	100錠	1,115.9円1錠	大日本住友	パーキンソン病(レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合)	なし	持参薬として使用しており、当院入院後も継続して投与したい。
2	限定 水城 まさみ	イクセロンパッチ4.5mg	リバスタグミン	4.5mg1枚	28枚	246.8円1枚	ノバルティス	軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	イクセロンパッチ9mg	本剤は1日1回4.5mgから開始し、原則として4週毎に4.5mgずつ増量するため、初回投与の場合には1枚4.5mg規格が必要である。
3	限定 山田 博之	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール		100錠	89.3円1錠	武田薬品工業	下記疾患又は術後における血栓・塞栓形成の抑制(胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がある患者に限る) 1.狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)、心筋梗塞、虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞)2.冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後	なし	持参薬として使用しており、当院入院後も継続して投与したい。
4	限定 種元 崇	バイエッタ皮下注5μgペン300	エキセナチド	1キット	1キット	9,937円1キット	アストラゼネカ	2型糖尿病(ただし、食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤(ピグアナイド系薬剤及びチアゾリジン系薬剤との併用を含む)を使用しても十分な効果が得られない場合に	なし	持参薬として使用しており、当院入院後も継続して投与したい。
5	限定 千葉 実行	アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	100mg1錠	100錠	37.2円1錠	ゼリア、アステラス	機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感	なし	持参薬として使用しており、当院入院後も継続して投与したい。
6	院外 水城 まさみ	レルベア100エリプタ30吸入用、レルベア200エリプタ30吸入用	ピラントロールトリフェニル酢酸塩、フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入1ブリスト	1ブリスト	100エリプタ5,987.2円、200エリプタ6,692.6円	グラクソ・スミスクライン	気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作用型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)	アドエア、シムビコート	本剤の適応となる症例に処方するため、院外処方用マスタ登録を申請する。
7	院外 菊池 喜博	レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩	20mg1錠	100錠	1,212.5円1錠	ファイザー	肺動脈性肺高血圧症	なし	本剤の適応となる症例に処方するため、院外処方用マスタ登録を申請する。
8	院外 水城 まさみ	ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物			269.8円1カプセル	ノバルティス	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)	なし	本剤の適応となる症例に処方するため、院外処方用マスタ登録を申請する。