

2015年5月26日



医薬品情報

薬剤科

2015. 5. 26 416

「サークレス注0.05%（50mg）」の販売名変更について

冠血管拡張剤「サークレス注0.05%（50mg）」（高田製薬）は、販売名が『硝酸イソソルビド注50mg／100mL「タカタ」』へ変更となりました。なお、適応症、用法・用量に変更はありません。

| | 新名称 | 旧名称 |
|--------------|---|--|
| 薬品名 | 硝酸イソソルビド注50mg／ 100mL 「タカタ」 | サークレス注0.05%50mg／100mL |
| 成分名、規格 | 硝酸イソソルビド、50mg／100mL／瓶 | |
| 適応症 用法・用量 | 1.急性心不全（慢性心不全の急性増悪期を含む）：成人には、本剤をそのまま、又は生食、5%ブドウ糖液等で希釈して0.05～0.001%溶液とし、1時間あたり1.5～8mgを点滴静注。投与量は、患者の病態に応じて適宜増減、増量は1時間あたり10mgまで 2.不安定狭心症：成人には、本剤をそのまま、又は生食、5%ブドウ糖液等で希釈して0.05～0.001%溶液とし、1時間あたり2～5mgを点滴静注。投与量は患者の病態に応じて適宜増減 3.冠動脈造影時の冠攣縮寛解：成人には、冠動脈造影時に本剤をそのまま、5mgをカテーテルを通し、バルサルバ洞内に1分以内に注入。投与量は患者の症状に応じて適宜増減、投与量の上限は10mgまで | |
| 外観写真 |  |  |

サークレスの在庫は終了いたしましたので新名称でのオーダーをお願いいたします。