

吸入指導依頼書


令和 年 月 日

調剤薬局薬剤師 殿

医師名： _____

この吸入指導依頼書は、病院と保険調剤薬局の間で治療に必要な情報を共有し、吸入療法に役立てるためのものです。この依頼書を受けられた場合は、以下の吸入療法連携フローに従い吸入指導をお願いします。

なお、ご不明な点は担当窓口まで問い合わせください。



保険調剤薬局と吸入指導連携を行うために、当院で構築した体制は以下の通りです。

- ① 医師は吸入指導が必要であると判断した患者に対して、『吸入療法指導せん』を発行する。
- ② 患者は『院外処方せん』と『吸入療法処方せん』を調剤薬局に提出する。
- ③ 保険調剤薬局は吸入指導を実施し、その結果を『吸入療法指導せん』の薬剤師コメント欄に記載し、当院の地域医療連携室に FAX で送信する。
- ④ 『吸入療法指導せん』は地域医療連携室→外来クラークを経由してカルテへ。
- ⑤ 次回診察時に医師がその結果を参考にしながら問診・検査などを実施する。

2回目以降は、必要に応じて①～⑤のやり取りを繰り返す。

- お願い

病状のコントロールが良好な場合でも定期的に吸入を継続するよう指導をお願いします。

- FAX 送信先・連絡先

国立病院機構 盛岡医療センター 地域医療連携室 FAX 019-647-9339 (電話 019-908-7001)

- 吸入指導連携について、ご不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問合せください。

国立病院機構 盛岡医療センター 薬剤科 (代表) (電話 019-647-2195 内線 303)

吸入療法指導せん

※ ☐内への記載をお願いいたします。

主治医			
指導依頼日	年	月	日
吸入療法歴	初めて	ヵ月	年目
吸入療法指導	☐ 初回	☐ 回目	

商品名	剤型・デバイス	含有成分	指導		
単剤	☐ サルタノール	インヘラー	pMDI	SABA	D・G
	☐ メブチン (☐ IP- ☐ キット IP ☐ スイグヘラー)	—	pMDI・DPI	SABA	D・G・E
	☐ エンクラッセ	エリフタ	DPI	LAMA	A
	☐ オンプレス	ブリースヘラー	DPI	LABA	B
	☐ シープリ	ブリースヘラー	DPI	LABA	B
	☐ スピリーバ (☐ ハンディヘラー (カプセル) ☐ レスピマット)	—	DPI・SMI	LAMA	B・F
	☐ フルタイド (☐ 100 ☐ 200)	ディスクス	DPI	ICS	A
	☐ パルミコート	タービュヘイラー	DPI	ICS	C
	☐ オルベスコ (☐ 100 ☐ 200)	インヘラー	pMDI	ICS	D・G
2成分	☐ アドエア (☐ 100 ☐ 25 (☐ 500)	ディスクス	DPI	ICS/LABA	A
	☐ レルベア (☐ 100 ☐ 200)	エリフタ	DPI	ICS/LABA	A
	☐ アデキュラ (☐ 低 ☐ 中 ☐ 高用量)	ブリースヘラー	DPI	ICS/LABA	B
	☐ フテホル・シムピコー (☐ SMART療法)	タービュヘイラー	DPI	ICS/LABA	C
	☐ フルティフォーム	エアソール	pMDI	ICS/LABA	D・G
	☐ アノーロ	エリフタ	DPI	LABA/LAMA	A
	☐ ウルティフロ	ブリースヘラー	DPI	LABA/LAMA	B
	☐ スピオルト	レスピマット	SMI	LABA/LAMA	F
3成分	☐ テリルシー (☐ 100 ☐ 200)	エリフタ	DPI	ICS/LABA/LAMA	A
	☐ エナジア (☐ 中用量 ☐ 高用量)	ブリースヘラー	DPI	ICS/LABA/LAMA	B
	☐ ビレーストリ	エアロスフィア	pMDI	ICS/LABA/LAMA	D・G
	☐ その他 ()	—	—	—	—
吸入量・回数	[朝 吸入]・[昼 吸入]・[夕 吸入]・[寝る前 吸入]				
吸入補助器の使用	☐ エアロチャンパープラス ☐ その他 ()				
主治医より連絡事項					
上記について吸入指導を依頼する。					

A ディスクス・エリフタ 評価	B ハンディヘラー ブリースヘラー 評価	C タービュヘイラー 評価
1.カバーを開ける	1.キャップを開ける	1.キャップの取り外し
2.薬剤のセット(レバーを押す)	2.カプセルを取り出す (薬剤のセット)	2.薬剤のセット
3.吸入動作	3.緑のボタンを押す	3.吸入動作
4.息こらえ	4.吸入動作	4.息こらえ
5.カバーを閉じる	5.息こらえ	5.残薬の確認
6.残薬の確認	6.吸入後のうがい	6.キャップの装着
7.吸入後のうがい	7.吸入器の保守・点検	7.吸入後のうがい
8.ディスクストレーナーによる 吸入方法の理解		8.タービュヘイラートレーナー による吸入方法の理解
D エアソール (吸入器 無) 評価	E スイグヘラー 評価	F レスピマット 評価
1.キャップをはずす	1.キャップをはずす	1.準備 (カートリッジの挿入と空噴霧)
2.吸入薬をよく振る	2.ボタンを押し下げる	2.ケースを180度回転させる
3.ボタンを押し下げる	3.息を吐く	3.キャップを開ける
4.吸入動作	4.吸入動作	4.吸入ポーズ
5.息こらえ	5.息こらえ	5.吸入動作
6.残薬の確認	6.キャップを閉める	6.息こらえ
		7.残薬の確認
G エアソール (吸入器 有) 評価	インチェック () L/min 目標値60 (30~100)	
1.キャップをはずす	薬剤師による指導内容 ☐ 院内 ☐ 調剤薬局	
2.吸入薬をよく振る		
3.スパーサーに吸入薬の装着		
4.薬剤を噴霧し、吸入動作		
5.息こらえ		
6.(必要に応じ、吸入動作の 繰り返し)		
7.吸入後のうがい		
8.スパーサーの補助器の 保守・点検		
		薬剤師名

※評価: 良好・やや良好・どちらともいえない・やや不良・不良
5-----4-----3-----2-----1